

ROTSPETSOPERATION

EFTER BEHANDLINGEN

Det är normalt att operationsområdet ömmar och är lite svullet dagarna efter operationen. Detta är en del i läkningsprocessen. Besvären avtar normalt efter några dagar. Även mindre blödning från operationssåret är normalt. Om det blöder lite mer kan du använda de sterila kompresserna som du får med dig efter operationen. Lägg en fuktad kompress mellan operationsområdet och kinden och håll på plats med ett lätt tryck i 15–20 minuter. Vår rekommendation vid värk är Alvedon 1 g max 4 gånger/dag. Eventuellt kompletterat med Ipren 400 mg 3 gånger/dag.

ATT TÄNKA PÅ

- Undvik tandborstning, tandtråd och mellanrumsborstar i området där operationen utförts en vecka efter operationen.
- Undvik att äta, dricka och skölja munden i två timmar efter operationen.
- Undvik att tugga på den sida som opererats så länge stygnen sitter kvar.
- Ät skonkost de första dagarna efter operationen. Det vill säga mat som inte behöver tuggas i stor omfattning. Exempelvis soppa.
- Använd antibakteriellt munsköljmedel med klorhexidin, till exempel Corsodyl i 5 dagar efter operationen. Finns receptfritt på apoteket.

KONTAKTA ENDODENTAL OM:

- Du inte kan kontrollera blödningen.
- Kraftig svullnad uppstår.
- Du drabbas av kraftig värk.
- Du får feber.
- Eller om du har ytterligare frågor.

Magnus Nordemar

Specialisttandläkare endodonti

ENDO | DENTAL